

La tuberculose...

Isoniazide (INH)

L'isoniazide (INH) est un médicament utilisé pour traiter la tuberculose. Il se présente sous la forme d'un comprimé blanc (100 mg, 300 mg).

Prenez _____ comprimés d'INH chaque jour.

Prenez _____ comprimés d'INH les jours suivants :

- Prenez ce médicament chaque jour à la même heure.
- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la aussitôt que vous réalisez votre oubli, **sauf** si c'est déjà le jour de votre dose suivante.
- Ne prenez pas plus d'une dose d'INH pour rattraper les doses manquées.
- Prenez ce médicament pendant la durée prescrite par le médecin.

Informez le médecin ou l'infirmière si vous :

- Souffrez d'une maladie du foie, d'une maladie des reins ou d'autres problèmes médicaux
- Prenez des médicaments sur ordonnance (y compris la pilule)
- Prenez des médicaments en vente libre
- Commencez de prendre un nouveau médicament pendant ce traitement
- Êtes enceinte ou tombez enceinte
- Allaitez
- Avez des allergies
- Buvez de l'alcool ou prenez de la drogue chaque jour ou en grande quantité

Symptômes à surveiller pendant le traitement à l'INH :

La plupart des gens n'ont aucun problème avec l'INH mais n'importe quel médicament peut causer des effets secondaires.

Si vous présentez un quelconque des symptômes suivants, arrêtez de prendre ce médicament et appelez l'infirmière ou le médecin du dispensaire antituberculeux aussitôt que possible. **N'attendez pas votre prochaine visite pour le faire.**

- Nausée, vomissements ou manque d'appétit
- Fièvre
- Fatigue très prononcée ou faiblesse
- Éruption cutanée, démangeaisons ou urticaire
- Urines de couleur sombre (de la couleur du thé)
- Jaunissement de la peau ou du blanc des yeux
- Selles blanches, grises ou beiges
- Maux de tête violents ou vertiges
- Engourdissement, douleurs ou picotements dans les mains ou les pieds

La consommation d'alcool, d'autres médicaments ou de drogues peut vous rendre plus susceptible d'avoir des effets secondaires dus à l'INH. **Restreignez votre consommation d'alcool et de drogues pendant la durée de ce traitement.**

Il se peut que le médecin vous demande de prendre de la pyridoxine (vitamine B6) avec l'INH pour éviter les effets secondaires.

Vous aurez un rendez-vous chaque mois avec le médecin ou l'infirmière du dispensaire antituberculeux pendant la durée de votre traitement à l'INH. Si vous avez des questions sur la tuberculose ou l'INH, appelez l'infirmière du dispensaire antituberculeux au :

Tél. : _____