

Isoniazida (INH) é um remédio usado para tratar a tuberculose (TB). INH é um comprimido branco (100 mg, 300 mg).

Você deve tomar _____ comprimidos de INH todos os dias.

Você deve tomar _____ comprimidos de INH nestes dias:

- Tome este remédio todos os dias, à mesma hora.
- Se tiver esquecido de tomar uma dose, tome-a assim que se lembrar, mas **não** a tome se já estiver no mesmo dia da sua próxima dose.
- Não tome duas doses de INH para recuperar o atraso.
- Tome este remédio pelo tempo que o médico disser.

Informe o médico ou o enfermeiro se você:

- Sofrer de doença do fígado, doença dos rins ou outros problemas de saúde.
- Tomar remédios vendidos com receita médica (inclusive pílulas anticoncepcionais)
- Tomar remédios vendidos sem receita médica
- Começar a tomar qualquer remédio novo durante este tratamento
- Estiver grávida ou engravidar
- Estiver amamentando
- Tiver alergias
- Consumir bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas todos os dias ou em grandes quantidades

Departamento de Saúde Pública de Massachusetts
Divisão de Prevenção e Controle da Tuberculose
www.mass.gov/dph/cdc/tb/

O que é preciso prestar atenção quando estiver tomando INH:

A maioria das pessoas pode tomar INH sem nenhum problema, mas qualquer remédio pode causar efeitos colaterais.

Se você tiver qualquer um dos sintomas descritos a seguir, pare de tomar o remédio e telefone para o médico ou enfermeiro da clínica de TB assim que possível. **Não espere até a próxima consulta.**

- Náusea, vômito ou perda de apetite
- Febre
- Sensação de fraqueza ou muito cansaço
- Erupção cutânea, coceira ou urticária
- Urina com cor escura (cor de chá)
- Pele ou olhos amarelados
- Fezes de cor branca, cinza ou castanho claro
- Tontura ou dor de cabeça muito forte
- Dormência, dor ou formigamento nas mãos ou pés

A ingestão de bebidas alcoólicas ou outros remédios ou drogas pode aumentar o risco de efeitos colaterais da INH. **Limite o uso de bebidas alcoólicas e drogas enquanto estiver tomando este remédio.**

O médico pode lhe dar piridoxina (vitamina B6) junto com a INH para ajudar a evitar efeitos colaterais.

Você terá uma consulta todos os meses com o médico ou enfermeiro enquanto estiver tomando INH. Se tiver dúvidas ou perguntas sobre TB ou INH, telefone para o enfermeiro da clínica de TB:

Tel: _____
